

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 25-3-65 883329

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

Tél. 88-30-34

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

Poste 571

15 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars. - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 54 DE MARS 1965

P. 11

DEUX-SÈVRES (sauf région de la Gâtine) - INDRE-et-LOIRE  
LOIRE-ATLANTIQUE - MAINE-et-LOIRE - VENDEE - VIENNE.

## AVERTISSEMENTS

## ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Dans la Vallée de la Loire, les premières projections d'ascospores ont commencé. Des contaminations sont possibles lors de prochaines pluies. Un traitement doit donc être exécuté dès réception de cette note sur tous les vergers ayant atteint le stade C 3-D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux). Ce stade est actuellement atteint ou localement dépassé dans la Vallée de la Loire par certaines variétés (par exemple, Passe-Crassane, Précoce de Trévoux, Beurré Hardy). Sur les variétés à débourrement plus tardif, effectuer ce traitement dès que ce stade sera atteint.

Etant donné l'importance des récentes pluies, ce traitement doit également être effectué dans les vergers protégés conformément à la note du 16 Mars.

Dans les Deux-Sèvres, région de la Gâtine, attendre de nouvelles informations de la Station pour traiter. Envisager cependant un très proche traitement.

Utiliser l'un des produits indiqués dans l'édition spéciale.

TAVELURE DU POMMIER - Attendre un très prochain bulletin pour intervenir.

## INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Les premières conidies viennent d'être observées dans les bourgeons contaminés l'année dernière. Pour être efficace, la lutte doit être très précoce. En conséquence, sur les variétés sensibles, il y aura lieu d'ajouter un produit actif contre l'Oïdium dans le très prochain traitement anti-tavelure.

CECIDOMYIE DES POIRETTES - Ce parasite ne présente un caractère de gravité que très localement. Dans les vergers de poiriers où des dégâts ont été constatés en 1964, effectuer, à l'occasion d'une prochaine intervention contre la tavelure, un traitement avec un insecticide à base de Zeidane (D.D.T.), d'H.C.H., de Lindane ou de Parathion, lorsque les boutons floraux seront bien séparés dans les inflorescences (Stade E).

RECTIFICATION A L'EDITION SPECIALE (liste des produits homologués).

A la page 3, paragraphe C, pomme de terre, rubrique "Doryphore poudrage", lire :  
"Carbaryl 1.000 grs. de matière active à l'Ha." au lieu de "Carbaryl 100 grs. de matière active à l'Ha.".

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,

J. DIXMERAS.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles,

R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

Tirage du 22 MARS 1965 - 2.570 exemplaires.